



LA NOCTULE DE LEISLER (CHAUVE-SOURIS)



PROGRAMME NATURA 2000 EN REVERMONT et DANS LES GORGES DE L'AIN




Réalisation par:



Qu'est ce que Natura 2000 ?

C'est un réseau de sites européens identifiant la faune, la flore et les habitats naturels patrimoniaux. Il vise à concilier la préservation de la biodiversité et les activités humaines.

Le site Revermont et Gorges de l'Ain a été créé en 2004. Il couvre 1830 ha, éclatés en 110 entités réparties sur 24 communes.



Avec le soutien de l'État et de l'Europe, Natura 2000 permet de sensibiliser les habitants et les acteurs du territoire à l'environnement et de mettre en place des actions préservant :

- les pelouses sèches pour maintenir les espèces liées à ces milieux ouverts comme les orchidées
- les grottes à chauves-souris.

Références :

- Groupe Chiroptères de la LPO Rhône-Alpes, 2014. *Les chauves-souris de Rhône-Alpes*. LPO Rhône-Alpes, Lyon, 480 p.
- Photo : C. ROLLAND.

Fiche de l'espèce

Famille : Chiroptères (qui signifie « main ailée »)

Taille : tête et corps : 4 à 7 cm ; avant-bras : 39-46 mm

Poids : 11 à 20 g

Longévité : jusqu'à 12 ans

Description

Le dos est plutôt brun-roussâtre, alors que le ventre est jaunâtre. Le museau, les oreilles et la membrane qui lui sert à voler (le patagium) sont brun-noir.

Les ailes sont longues et étroites, avec une partie très velue le long du corps et des bras. La base des poils est brun-noir. Cette double coloration est caractéristique de cette noctule.

Son oreille est petite, triangulaire, avec une saillie externe (le tragus) en forme de champignon.

Alimentation

Sortant du gîte peu après le coucher du soleil, la Noctule de Leisler chasse de son vol rapide et puissant, haut dans le ciel, en faisant des piqués. Elle va chercher en priorité papillons de nuit, scarabées et hannetons. Les points d'eau sont des sites de chasse privilégiés, où elle trouve divers insectes volants comme les moustiques.

Habitat

Espèce forestière, la Noctule de Leisler peut être observée jusqu'à 2200 m d'altitude. Gîtant principalement dans les arbres creux, elle s'installe dans les massifs forestiers de feuillus, parfois de résineux ;

elle peut aussi occuper des gîtes construits par les humains (fissures de bâtiments, nichoirs).

Une chauve-souris qui voit du pays

La Noctule de Leisler peut parcourir 10 km par nuit pour se nourrir. Elle fait partie des 4 seules espèces de chauves-souris considérées comme migratrices en Europe. Elle peut parcourir de grandes distances. Le déplacement observé le plus important a atteint 1 245 kilomètres, entre la Russie et la Turquie.

Reproduction

A la fin de l'été, le retour des femelles revenant de l'est de l'Europe marque le début de la période des accouplements, pendant laquelle les mâles choisissent un gîte ; un mâle peut féconder jusqu'à dix femelles. En France, les gîtes de mise-bas sont rares mais on en découvre chaque année. Les nurseries dans les troncs creux comptent habituellement de 20 à 40 femelles, parfois 100 (jusqu'à 150 dans les bâtiments). Les naissances s'échelonnent de mi-juin à début juillet ; les jumeaux ne sont pas rares. Les jeunes sont presque tous volants début août.

État des populations

Protégée et classée «Quasi-menacée» au niveau national, l'espèce est menacée par :

- la perte de son habitat naturel et des couloirs de déplacement
- les perturbations dues à l'exploitation forestière
- les insecticides (qui détruisent sa nourriture)
- les éoliennes (lors des migrations).